

Liovital® *mirtillo*

8 FLACONCINI MONODOSE
PER USO ORALE



Vaccinium myrtillus L. e.s.

Vitis vinifera L. e.s.

Polline micronizzato

Gelatina reale liofilizzata

SENZA GLUTINE

INGREDIENTI

Contenuto del tappo dosatore: pappa reale (gelatina reale) liofilizzata; maltodestrine; antiagglomeranti: silicio biossido (nano) e magnesio ossido; agente di carica: cellulosa microcristallina.

Contenuto del flaconcino: acqua; fruttosio; mirtillo (Vaccinium myrtillus L.) succo spray limpido (mirtillo, maltodestrina); mirtillo nero (Vaccinium myrtillus L.) bacche fresche estratto secco tit. 1% in antocianine espresse come cianidina 3-glucoside cloruro (mirtillo, destrosio); vite rossa (Vitis vinifera L.) semi estratto secco tit. 95% in Procianidine; polline micronizzato idrosolubile; correttore di acidità: sodio lattato sol. 60%; conservante: potassio sorbato; aroma frutti di bosco; aroma lampone; correttore di acidità: acido citrico.

CONFEZIONE E CONTENUTO

Confezione da 8 flaconcini monodose in PET ambrato da 10 ml con tappo serbatoio.

CATEGORIA

Integratore alimentare.

INDICAZIONI

LIOVITAL® mirtillo contiene estratti standardizzati e titolati di Mirtillo nero (frutti) e di Vite rossa (semi) associati a polline micronizzato idrosolubile e a gelatina reale liofilizzata. Il Mirtillo nero è utile per l'efficienza della microcircolazione, il polline e la gelatina reale sono sostanze ricche di aminoacidi essenziali, vitamine e minerali.

DOSE CONSIGLIATA

1 o 2 flaconcini al giorno, secondo necessità.

AVVERTENZE

Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta equilibrata e variata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente (15 - 30°C) e non esporre a fonti di calore localizzate. La data di fine validità si riferisce al prodotto in confezione integra, correttamente conservato.

ATTENZIONE

Essendo la gelatina reale una sostanza colloidale non solubile, il flaconcino ricostituito si presenta come una sospensione lattescente.

ISTRUZIONI PER L'USO

- 1) Avvitare completamente il tappo fino ad ottenere la rottura del sigillo, affinché la polvere contenuta nella capsula scenda nel flaconcino.
- 2) Agitare bene prima dell'uso.
- 3) Svitare il tappo.
- 4) Assumere per via orale secondo i consigli riportati sull'astuccio.

La persistenza, ad agitazione avvenuta, di corpuscoli indisciolti è parte integrante delle caratteristiche del prodotto e non va quindi intesa come indice di alterazione.



PRODOTTO E CONFEZIONATO:

Vedi confezione esterna