Macrostip®

14 BUSTINE

Dispositivo medico monouso

Macrogol 4000 10 g
Polvere per soluzione orale

SENZA LATTOSIO
SENZA GLUTINE
SENZA CONSERVANTI
SENZA AROMI

1. DESCRIZIONI E INDICAZIONI D'USO
Dispositivo medico a base di Macrogol 4000 indicato per il trattamento della stitichezza cronica; trattamento del fecaloma; trattamento della stipsi con coliche a carattere episodico o cronico.
1.1 MECCANISMO D'AZIONE
Macrostip® è un prodotto ad azione lassativa che, grazie al meccanismo osmotico, regolarizza le funzioni intestinali. Non viene assorbito, né fermenta nell'intestino, non irrita la mucosa e viene eliminato nelle feci in forma non modificata. Grazie infatti alla sua affinità per l'acqua **Macrostip**® bustine ammorbidisce le feci facilitando l'evacuazione. La sua azione non si riduce nel tempo.

2. DOSE E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE
Adulti, anziani e bambini a partire dai 12 anni: 1 bustina a dose intera (10 g) 1-3 volte al giorno. Aprire la bustina lungo la linea tratteggiata e diluire il contenuto in 125 mL (circa 1 bicchiere d'acqua non gassata). In caso di uso prolungato si può ridurre la dose ad 1-2 bustine al giorno
Bambini da 7 a 11 anni: mezza bustina (5 g) due volte al giorno. Diluire il contenuto in 62,5 mL (circa mezzo bicchiere d'acqua non gassata).
Bambini da 3 a 6 anni: mezza bustina (5 g) una volta al giorno. Diluire il contenuto in 62,5 mL (circa mezzo bicchiere d'acqua non gassata).

3. MODALITÀ D'USO
Sciogliere il contenuto in un bicchiere d'acqua (125 mL). Bere la soluzione così ricostuita. È possibile suddividere la dose giornaliera in più somministrazioni. Si consiglia di assumere **Macrostip**® bustine lontano dai pasti.

4. COMPOSIZIONE
Una bustina di polvere da 10 g contiene Macrogol 4000 10 g.

5. FORMATI
- Confezione da 14 bustine singole da 10 g.
- Confezione da 30 bustine singole da 10 g.

6. CONTROINDICAZIONI E LIMITAZIONI PER L'USO
Non assumere **Macrostip**® bustine in caso di ipersensibilità nota alle materie prime, perforazione e/o ostruzione gastrointestinale, lesioni gastriche o intestinali note, gravi patologie infiammatorie del tratto gastrointestinale come morbo di Crohn, colite ulcerosa e megacolon tossico.

7. INTERAZIONI NOTE
Non sono note interazioni con farmaci ma è opportuno che l'assunzione del prodotto sia distanziata di almeno 2 ore da quella di farmaci somministrati per

via orale poiché il potere osmotico del macrogol e l'aumento della velocità di transito gastrointestinale indotta possono influire negativamente sulla loro azione. Consultare comunque il medico prima di assumere **Macrostip**®bustine in caso di altre terapie in atto. **Macrostip**® bustine può potenzialmente interagire se usato con addensanti alimentari a base di amido. L'ingrediente macrogol contrasta l'effetto addensante dell'amido, liquefacendo in tal modo le preparazioni che devono rimanere dense per le persone con problemi di deglutizione.

8. EFFETTI INDESIDERATI NOTI

Macrostip® bustine è di solito ben tollerato poiché il suo meccanismo d'azione è di tipo fisico/meccanico e non dipende da un assorbimento sistemico. Durante la sua assunzione possono verificarsi effetti indesiderati quali cattiva digestione, mal di stomaco o brontolii, gonfiore, flatulenza, nausea, vomito, irritazione anale e leggera diarrea. Si tratta di effetti che migliorano riducendo la dose. In caso di reazioni allergiche occorre interrompere l'assunzione e contattare il medico. Qualora si riscontrasse qualsiasi effetto indesiderato, informare il medico o il farmacista.

9. MODALITA' DI CONSERVAZIONE

La data di scadenza è indicata sulla confezione e sulla bustina; si riferisce al prodotto in confezione integra, correttamente conservato. Non utilizzare oltre tale data o qualora la confezione risulti aperta o danneggiata. Conservare il dispositivo ben chiuso, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce e dal calore.

10. AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Durante la gravidanza e l'allattamento consultare il medico prima di assumere il prodotto. L'uso nei bambini al di sotto dei 12 anni deve avvenire preferibilmente sotto controllo medico. Non utilizzare **Macrostip**® bustine per più di 30 giorni consecutivi, se i sintomi persistono consultare il medico. Evitare il contatto con gli occhi. Non utilizzare il dispositivo medico oltre la data di scadenza. Non utilizzare in caso di confezione danneggiata. Il trattamento del fecaloma richiede l'intervento di un parere preventivo del medico.

11. SMALTIMENTO

Il dispositivo scaduto o da smaltire deve essere manipolato secondo le norme di gestione dei rifiuti dell'autorità locale competente. Non disperdere in nessun caso il prodotto o la sua confezione nell'ambiente.

Pharma Line S.r.l.
Via Bertani, 2 - 20154 Milano



Revisione 0 del 11/2021
Macrostip® è un marchio registrato di proprietà di Pharma Line S.r.L.