Macrostip®

250 ml SOLUZIONE ORALE

Dispositivo medico

Macrogol 4000 125 g
Flacone da 250 g con misurino graduato

SENZA LATTOSIO
SENZA ZUCCHERO
SENZA GLUTINE

1. DESCRIZIONI E INDICAZIONI D'USO
Dispositivo medico a base di Macrogol 4000 indicato per il trattamento della stitichezza cronica, per il trattamento del fecaloma e per il trattamento della stipsi con coliche a carattere episodico o cronico.
1.1 MECCANISMO D'AZIONE
Macrostip® soluzione orale è un prodotto ad azione lassativa che, grazie al meccanismo osmotico, regolarizza le funzioni intestinali. Non viene assorbito, né fermenta nell'intestino, non irrita la mucosa e viene eliminato nelle feci in forma non modificata. Grazie, infatti alla sua affinità per l'acqua **Macrostip**® soluzione orale ammorbidisce le feci facilitando l'evacuazione. La sua azione non si riduce nel tempo.

2. DOSE E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE
Adulti e bambini sopra gli 8 anni: 20-40 mL di soluzione al giorno da assumere in un bicchiere da 150 mL con acqua o succo di frutta o tè, preferibilmente in un'unica somministrazione al mattino.
Bambini da 4 a 7 anni: 15-30 mL di soluzione al giorno da assumere in un bicchiere da 150 mL con acqua o succo di frutta o tè, preferibilmente in un'unica somministrazione al mattino.
Bambini da 2 a 3 anni: 10-15 mL di soluzione al giorno da assumere in un bicchiere da 150 mL con acqua o succo di frutta o tè, preferibilmente in un'unica somministrazione al mattino.
Infanti da 6 mesi ad 1 anno (con peso superiore ai 7 Kg): 5-10 mL di soluzione al giorno da assumere in un bicchiere da 50 mL con acqua, preferibilmente in un'unica somministrazione al mattino.
Dopo l'uso, sciacquare il misurino con acqua calda e non rimetterlo nella scatola fino a quando non è completamente asciutto.

3. MODALITÀ D'USO
Sciogliere il contenuto in un bicchiere da 150 mL o da 50 mL (per infanti da 6 mesi e 1 anno) con acqua o succo di frutta o tè. Bere la soluzione così ricostituita.

4. COMPOSIZIONE
Un flacone da 250 mL contiene Macrogol 4000 125 g. Eccipienti: acqua depurata, acido citrico, aroma, sodio benzoato, potassio sorbato, sucralosio.

5. FORMATO
- Confezione con un flacone da 250 g con misurino graduato.

6. CONTROINDICAZIONI E LIMITAZIONI PER L'USO
Non assumere **Macrostip**® soluzione orale in caso di ipersensibilità nota alle materie prime,

perforazione e/o ostruzione gastrointestinale, lesioni gastriche o intestinali note, gravi patologie infiammatorie del tratto gastrointestinale come morbo di Crohn, colite ulcerosa e megacolon tossico.

7. INTERAZIONI NOTE

Non sono note interazioni con farmaci ma è opportuno che l'assunzione del prodotto sia distanziata di almeno 2 ore da quella di farmaci somministrati per via orale poiché il potere osmotico del macrogol e l'aumento della velocità di transito gastrointestinale indotta possono influire negativamente sulla loro azione. Consultare comunque il medico prima di assumere **Macrostip**® soluzione orale in caso di altre terapie in atto. **Macrostip**® soluzione orale può potenzialmente interagire se usato con addensanti alimentari a base di amido. L'ingrediente macrogol contrasta l'effetto addensante dell'amido, liquefacendo in tal modo le preparazioni che devono rimanere dense per le persone con problemi di deglutizione.

8. EFFETTI INDESIDERATI NOTI

Macrostip® soluzione orale è di solito ben tollerato poiché il suo meccanismo d'azione è di tipo fisico/meccanico e non dipende da un assorbimento sistemico. Durante la sua assunzione possono verificarsi effetti indesiderati quali cattiva digestione, mal di stomaco o brontolii, gonfiore, flatulenza, nausea, vomito, irritazione anale e leggera diarrea. Si tratta di effetti che migliorano riducendo la dose. In caso di reazioni allergiche occorre interrompere l'assunzione e contattare il medico. Qualora si riscontrasse qualsiasi effetto indesiderato, informare il medico o il farmacista.

9. MODALITA' DI CONSERVAZIONE

La data di scadenza è indicata sulla confezione e sull'etichetta; si riferisce al prodotto in confezione integra, correttamente conservato. Non utilizzare oltre tale data o qualora la confezione risulti aperta o danneggiata. Conservare il dispositivo ben chiuso, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce e dal calore. Utilizzare **Macrostip**® soluzione orale entro 3 mesi dall'apertura.

10. AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Durante la gravidanza e l'allattamento consultare il medico prima di assumere il prodotto. L'uso nei bambini al di sotto dei 12 anni deve avvenire preferibilmente sotto controllo medico. Non utilizzare **Macrostip**® soluzione orale per più di 30 giorni consecutivi, se i sintomi persistono consultare il medico. Evitare il contatto con gli occhi. Non utilizzare il dispositivo medico oltre la data di scadenza. Non utilizzare in caso di confezione danneggiata. Il trattamento del fecaloma richiede l'intervento di un parere preventivo del medico.

11. SMALTIMENTO

Il dispositivo scaduto o da smaltire deve essere manipolato secondo le norme di gestione dei rifiuti dell'autorità locale competente. Non disperdere in nessun caso il prodotto o la sua confezione nell'ambiente.

Pharma Line S.r.l.
Via Bertani, 2 - 20154 Milano

Revisione 0 del 11/2021
Macrostip® è un marchio registrato di proprietà di Pharma Line S.r.L.