
REFLUSSO GASTROESOFAGEO (GER)

REFLUSSO LARINGO-FARINGEO (LPR)



Il passaggio di contenuto gastrico nell'esofago fino alla parte posteriore della gola, irritando la gola, i seni paranasali e i polmoni.

REFLUSSO: UNO STESSO PROCESSO PATOLOGICO MA CON QUADRI CLINICI DIVERSI

Reflusso gastroesofageo (GER)

Reflusso laringo-faringeo (LFR)

Tipici "digestivi"

SINTOMI

Atipici "extra digestivi"

Notturna

INSORGENZA

Diurna

Posizione clinostatica

MODALITÀ

Posizione eretta

LES

MECCANISMI DI DANNO MUCOSO

UES

Peristalsi, flusso salivare

MECCANISMI DI COMPENSO

Nessuno

Connettiviti, m.nerologiche

CONCAUSE

Traumatismo glottico

IL 10-20% DELLA POPOLAZIONE GENERALE SOFFRE DA GERD

DEI PAZIENTI CON GERD PRESENTA SINTOMI EXTRAESOFAGEI

IL 19,9% - 38,7% CON SINTOMI EXTRAESOFAGEI PRESENTA DISTURBI A CARICO DELLA GOLA

DI CUI, IL 50%

PRESENTA TOSSE CRONICA CON PERIODICHE
REMISSIONI E RIACUTIZZAZIONI DEL DISTURBO