


RICONOSCERE I SINTOMI PER UN CORRETTO TRATTAMENTO

SINTOMATOLOGIA GERD

Epigastralgia
Pirosi
Singhiozzo
Rigurgito acido
Dolore retrosternale
Dispepsia




SINTOMATOLOGIA LPR

Globo faringeo/disfagia
Tosse
Disfonia
Scialorrea
Odinofagia
Gola secca
Laringospasmo
Alitosi
Asma
Otalgia
Dolore laterocervicale
Rinorrea
Ostruzione nasale
Dispnea

30%
MALATTIA
DA REFLUSSO
EROSIVA

5%
MRGE
COMPLICATA



65%
ENDOSCOPIA
NEGATIVA

71-92% disfonia

44-51% tosse cronica

42-50% necessita di schiarirsi la voce

33-47% sensazione di corpo estraneo

27% disfagia

60% aspirazione di acido o bile nelle vie respiratorie fino anche alla formazione di lesioni granulomatose nei 2/3 posteriori del laringe

Piu raramente si riscontrano malattie del tratto respiratorio, quali:

Asma - Stenosi laringea o sottoglottica

Laringospasmo - Apnee durante il sonno

700 MILIONI
DI EURO

È LA SPESA IMPEGNATA DALLA SANITÀ PER IL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DEL REFLUSSO CON INIBITORI DI POMPA PROTONICA (IPP) OGNI ANNO.

IPP: RISCHI PRINCIPALI

Maggior rischio di fratture di vertebre, femore e polso con alte dosi o per oltre 1 anno

Polmoniti. 1 caso di polmonite da prazoli ogni 111 pazienti in terapia (rischio più alto all'inizio).

Infezioni intestinali anche molto serie.

Minor assorbimento di ferro, vitamina B12, magnesio, ecc.

Allergie da cibo.

Riduzione dell'efficacia di clopidogrel e cardioaspirina, farmaci che proteggono pazienti ad alto rischio d'infarto.

Varie **reazioni psichiatriche.** Inoltre l'uso cronico può concorrere alla perdita di funzioni mentali negli anziani.

Nefrite acuta interstiziale. Rara ma grave reazione renale dopo mesi d'uso di prazoli.

Seri rischi di effetto rimbalzo e dipendenza: possono dare e cronicizzare i sintomi per cui si usano come cura