

Viscoflu®

GOLA

Ectociclina-PROg®



SENZA GLUTINE

1. IDENTIFICAZIONE, COMPOSIZIONE E SCOPO DEL DISPOSITIVO MEDICO

1.1 DESCRIZIONE ED INDICAZIONI D'USO

Viscoflu® Gola è un dispositivo medico a base di Ectociclina-PROg®, miscela contenente estratto idroglicerico di Propoli e Pompelmo ed Ectoina.

Viscoflu® Gola è indicato come trattamento protettivo in caso di processi infiammatori della mucosa faringea e orale.

1.2 CONTROINDICAZIONI E LIMITAZIONI D'USO

Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno degli eccipienti. **Viscoflu®** Gola è controindicato nei bambini al di sotto dei 3 anni d'età. **Viscoflu®** Gola è controindicato nei soggetti asmatici e per coloro che sono allergici alla propoli.

Viscoflu® Gola può causare reazioni allergiche, specialmente nei soggetti allergici alle punture delle api o ai prodotti dell'alveare. In ogni caso, si consiglia di consultare il proprio medico prima di assumere **Viscoflu®** Gola.

1.3 COMPOSIZIONE

Un flacone da 20 ml contiene: Ectociclina-PROg® g 6,4 (estratto idroglicerico di Propoli e Pompelmo g 6,0, Ectoina g 0,4); acqua depurata, glicerina; aroma limone; aroma menta; stabilizzante: acido citrico; conservanti: sodio benzoato, potassio sorbato.

1.4 MECCANISMO D'AZIONE

Viscoflu® Gola protegge la mucosa faringea e orale attraverso l'azione fisico-chimica della miscela Ectociclina-PROg® in esso contenuta, nella quale:

- l'estratto idroglicerico di Propoli e Pompelmo in grado di formare una barriera protettiva sulle mucose infiammate, contribuisce a preservare le vie respiratorie dall'aggressione di agenti esterni;
- l'ectoina è una sostanza organica che, legandosi alle molecole d'acqua, svolge un'azione idratante - emolliente.

2. FORMATO DELLA CONFEZIONE

Soluzione in flacone di vetro da 20 ml, con erogatore in bustina sigillata.

3. MODALITÀ D'USO E DOSE DI SOMMINISTRAZIONE

La confezione contiene l'erogatore in un sacchetto sigillato. Inserire l'erogatore nel flacone, rimuovere il tappino dall'erogatore, agitare il flacone prima dell'uso. Utilizzando l'apposito erogatore, si raccomanda di applicare nel cavo orale le seguenti dosi:

Bambini da 3 ai 6 anni: applicare 1-2 nebulizzazioni della soluzione nel cavo orale; ripetere fino a 3 volte durante il giorno.

Adulti e bambini sopra i 6 anni: applicare 2-4 nebulizzazioni della soluzione nel cavo orale; ripetere fino a 5 volte al giorno.

In caso di affezioni localizzate, applicare direttamente sulla parte interessata. L'eventuale presenza di piccoli depositi è dovuta all'alta concentrazione degli estratti e non influisce sulla qualità del prodotto. Non utilizzare per più di 10 giorni consecutivi, a seconda del quadro clinico da trattare. Il trattamento può eventualmente essere ripetuto più volte durante l'anno, interrompendo l'uso del prodotto per almeno una settimana tra un ciclo e l'altro. Utilizzare

il prodotto entro 2 mesi dalla prima apertura.

3.1 EFFETTI COLLATERALI

L'elevata concentrazione di estratto idroglicerico di Propoli e Pompelmo può causare una leggera sensazione di bruciore dopo l'applicazione; tale effetto scompare dopo pochi secondi. Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglietto illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

4. MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente, al riparo dalla luce e da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

5. AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Lavare l'erogatore con acqua dopo ogni applicazione. Si consiglia di chiudere accuratamente il cappuccio dell'erogatore dopo l'uso con l'apposito tappino. Non utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia individuale ad uno o più componenti del prodotto. L'uso prolungato dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; nel caso in cui tali fenomeni dovessero manifestarsi è necessario sospendere il trattamento e consultare il medico. Tenere il prodotto lontano dalla portata e dalla vista dei bambini. Non utilizzare il dispositivo oltre la data di scadenza. Non utilizzare in caso di confezione danneggiata. Durante la gravidanza e l'allattamento consultare il medico prima di utilizzare il prodotto. Non bere il contenuto del flacone. Evitare di spruzzare negli occhi. L'uso dello stesso flacone da parte di più soggetti può facilitare la trasmissione di infezioni.

6. SMALTIMENTO

Il dispositivo scaduto o comunque da eliminare deve essere gestito come da regolamento di gestione dei rifiuti dell'Ente Gestore Locale. Non disperdere in nessun caso il prodotto o la sua confezione nell'ambiente.



Pharma Line S.r.l. - Via Bertani 2
20154 Milano

Revisione 2 del 01/2024



Viscoflu® e **Ectociclina-PROg®**

sono marchi registrati di proprietà di **Pharma Line S.r.l.**